幸福三日刊

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

本報特聘羅家衛律師爲法律顧問

幸福報

鈕儀署

第三二八期

（民國二十年四月廿四日）

◀每份售洋二分▶

館址上海三馬路雲南路口

定報價目

每三日出一張。五個月一元。全年二元。寄費在內。本外埠一律。國外加倍。郵票代現九五計值。

廣告價目

每期每格（共計五方寸）五元。均排於新聞之旁。如嵌入新聞中。長期面議。

◀本期要目▶

△對病家說幾句話
△血症雜談
△經驗良方
△膀牽筋與雞腳風
△手指足趾發麻
△多汗
△遺尿之研究
△改良煎劑之討論
△溫病治法

內科 小兒科 專家尤學

周醫士診例

【時間】上午九時至十二時。下午二時後出診。

【診金】門診一元。出診四元。膏方四元。丸方四元。通函論症二元。通函處方一元。郵費自理。

【診所】上海盆湯弄橋北北山西路泰安里第四弄五十八號

□對病家說幾句話

（涼月）

我讀了嚴獨鶴先生的『對名醫說一句話』之後。不覺連想到病家方面。亦有幾句重要的話。是爲病家所不可不知的。今特分述於后。

□無信任心　現在的病家。請醫生看病。往往服了一二劑藥。就要換醫生。他亦不問自己的病。是否可以一二劑藥所能痊愈的。反說看了若干醫生。服了若干劑藥。仍不見效。其實這種醫法。不但無益。反而有害。因爲醫生的用藥。未必相同。今日你一拳。明日我一腳。就是吃壞了病。醫生亦不負責任的。所以奉勸病家。請醫治病。第一要有信任心。

□誤服仙方　有的病家。一方延醫服藥。一方卻在暗中求神問卜。另進仙方。他亦不知仙方與病情。是否相宜。一旦誤服。反以爲醫生的藥方不靈。豈不冤哉枉也。

□中西並進　在富貴人生了病。往往因爲金錢多。生命重。請了中醫。還請西醫。進了中藥。再服西藥。他自己本來是希望疾病速愈。卻不知藥性不同。反而越弄越糟。結果。與窮人無力延醫。以致不救者相同。古人說太過與不及。均非中庸之道。這句話真是一些亦不錯。

本報主筆

楊志一醫士　朱振聲醫士　診例

(甲)特號二元　隨到隨診
(乙)門診一元　貧病減半
(丙)出診四元　路遠酌加
(丁)膏丸方四元　次日取件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　六三四九三

掛號處啓

主持者有學識經驗及人格

又名社會醫藥常識報

出版務求信用有切實保證

□問病簡章

(甲)定戶

凡幸福報定戶。欲來函問病者。須將本館所發之問病紙。填明寄下。如問病紙已遺失或用去。須再向本館購買。『此種問病紙。每張實售大洋一元。定戶半價。祇收半元。』否則。隨問病函附郵票五角。亦可通融。空函恕不答覆。

(乙)社員

凡康健保障社社員。欲來函問病者。須將本社所給之社證。隨同問病函一并寄下。『此證答病時仍寄還』如第一次已問過。而欲再問病者。亦須附郵票五角。『社證仍須附寄』以示限制。否則。亦不答覆。

(丙)讀者

凡非定戶與社員。而欲來函問病者。一律須附郵票一元。複診亦然。否則不覆。

(丁)膏丸方

膏丸方每張四元。隔日取件。『郵寄亦可』如係定戶或社員。均作半價。祇收二元。『定戶須將定單號碼示知。社員須將社証附寄。』否則概收四元。

(戊)附告

(一)問病者須將『起病原因』。『經過情形』。『現在病狀』。『二便如何』。『服過何藥』等等。詳細示知。若來函不詳而草草者不答。以免誤事。
(二)病勢危急。本館答覆緩不濟急者。不答。
(三)凡問詢題目中。本館有不能解答者。或登報徵求。或原函寄還。
(四)凡欲在報上披露者。遲速不能一定。
(五)凡事涉離奇。跡近荒誕。怪方僻藥。概不在問答之列。

上海幸福報館 康健保障社 同啓

□溫病治法(十)

蔣譽卿遺著

倘伏暑之邪。盤踞太陰陽明。不畏寒而發熱淹綿。欬逆作嘔。汗出不暢。屢服發表透汗之劑。汗仍全無。厚膩之苔。漸黃漸燥。漸黑漸焦。是伏暑之熱。已傷其陰。逼近心包。急宜開泄清熱法。佐以保津。冀其微汗透疹。方爲吉兆。

開泄清熱法

淨連翹三錢　粉前胡錢半
淡豆豉三錢鮮生地五錢同打
真川貝去心二錢　大力子錢半(炒杵)
玉泉散包五錢
廣玉金二錢　瓜蔞皮三錢
黑梔三錢　淡竹葉卅張
燈心卅寸。白蘆根去節五錢

此方服後。邪仍不達。陰滯益傷。舌苔灰燥起刺。齒焦乾唇。大便泄瀉。口渴引飲。當此之時。先止其瀉。以保津液。急用清熱歛陰法。

清熱歛陰法

帶心連翹四錢　廣玉金二錢
葛根炭錢半　滑石通草包五錢
元米炒西洋參二錢
京川貝去心二錢　姜川連麥冬扎四分　茯苓神各三錢
玉泉散荷葉包五錢　天花粉三錢　霍山石斛五錢
白薇錢半　淡竹葉卅張
活水蘆根去節一兩

服後諸恙不退。頗有內陷風動之象。可仿春溫門中變證治之。(以上之法均是心得頗有効驗)

秋暑（秋涼附）

七月大火西流。暑氣漸減。而涼氣漸生。其時炎熱尚存。一如盛夏。亦有較盛夏更熱之年。人感其氣而病者爲秋暑。即世俗所謂秋老虎是也。此時濕土主氣。猶是暑濕交蒸。但見壯熱煩渴。蒸蒸自汗。脉象洪濡或數。是秋暑之證。（未完）

□血症雜談（二）

（楊志一）

□經閉與吐血

吐血一症。最爲危險。苟不速治。每易成癆。獨女子經閉之吐血。（俗稱倒經）其勢雖猛。其治較易。蓋但用上病下治之法。通其經而血自止。如日前出診大馬路鴻康電料行樓上徐姓之症。即其一例也。患者爲一廿餘歲女子。吐血盈盞。連日未止。咳嗽胸痛。苔黃口乾。問其經水來否。則曰四十餘日未來矣。余曰。症屬經閉於下。血逆於上。加以感受燥邪。肺失肅降。法當清燥救肺。導血下行。處方如下。鮮生地一兩。當歸尾三錢粉丹皮、赤白芍各二錢。黛蛤散一兩（包）。參三七八分（研冲）。桑葉皮各三錢。杏仁、瓜蔞各三錢。鬱金錢半。淮牛膝二錢。十灰丸四錢（吞）。此方服一劑。經水即臨。再劑吐血全止。方中妙在利用牛膝一味。引諸藥以下達。故見效有如此之速也。

經驗良方

□驗方一束

（王肖舫）

臭虫血　近讀某醫報可以打爛塗蛇蚊傷。屢經實驗。凡蝎螫蜂傷。及他毒物外傷。疼不可忍者。皆可塗之。極效。委因臭虫血含有阿摩尼亞質。故能具上述各效也。

貓胞衣　焙研末香油調塗。瘰癧久不收口者。一二次。即收口痊癒。

生壁虎　一名蝎虎。去尾（其毒在尾）去腸雜。去皮足頭。只取腿肉脊骨搯碎。生用爲丸藥勿嚼。生呑數次。治瘰癧極效。確有攻血的效力。惟須即速用。萬勿稽遲。以妨腐。尤勿生留過宿。用則毒人。切記。因此物其毒在尾。如留用過宿。伊飢則自食其尾。故不敢再用也。切記切記。

蘄茁炭　即蘄之根茁焙炭。以香油調塗瘰癧潰爛收口極速。此物乃北地名稱。南方之孛麻根苗約即此物也。請試用之。

沙裏狗　即沙灘內小虫。形如蜘蛛。大肚而黑。內有黃黑汁。取數十個焙研末。加冰片少許。治紅白口瘡。搽之立效。

蜀秫花　一名高粱。取其花焙研末。以蜜汁拌二三手空心食之。治久痢極效。

□膀牽筋與雞脚風

（尤學周）

【原因】感受寒氣。局部痞攣。

【症狀】膀牽筋者。小腿旁之經絡。有一條驟然收縮。撫之有結節。酸痛不能擧步。雞脚風者。手指或足趾强强引如雞脚然。不能動作。

【療法】每日飲虎骨木瓜酒一二口。或滴冷水於患處摩擦之。日行五六次。

□手指足趾發麻

【原因】血虛氣弱。血液不能營養四肢。以致末稍神經失其功力。

【症狀】手指與足趾發麻。輕力着物。一無知覺。甚則爲痺。全無感覺。

【療法】輕者。以兩手磨擦使血液暢行。其痺而不虛者。用黑穭豆一兩。海風藤錢半。淸水煎服。至一月後。即可收功。

□多汗

【原因】汗者。乃皮膚蒸發之水氣。所以調節身體溫度。此調節機能。操之於神經。如血管神經變常。即生本症。

【症狀】手。足。腋窩及臀部。分泌多量之黏液。

【療法】勤以溫水洗滌用荊芥防風等分。煎湯薰洗尤佳洗後。以海螵蛸末摻之。

再版出世

青年病

青年一切疾苦之慈航　青年男女慾海之明燈

本書內容略擧一斑

▲夢遺外治法　▲遺精避免法　▲滑精特效方　▲手淫防止法　▲早泄求子法　▲陽痿自療法　▲脫陽急救法　▲夾陰傷寒方

▲五淋辨治法　▲急性白濁方　▲久濁除根方　▲久帶必止方　▲女子夢交方　▲防免白濁法　▲下疳特效藥　▲橫痃內消法

▲魚口便毒方　▲楊梅結毒方　▲毒性喉痔方　▲楊梅瘋癱方　▲性慾[illegible]法　▲玉莖癢痛方　▲繡球瘋驗方　▲遺尿經驗方

▲青年衞生術　▲精滑種子方　▲可靠避孕術　▲天然美容法　▲心理却病法　▲疝氣簡効方　▲少年耳聾方　▲靈效雀斑方

全書兩冊　正價　特價　郵收　大洋壹元

上海三馬路[illegible]幸福報館發行

□遺尿之研究（二）

（朱振聲）

且其中更有挾寒（家韭子丸）挾熱（白薇散）滑脫（秘元丹牡蠣丸）以及命火衰微（右歸飲鞏隄丸）之別。除此之外。亦有因心氣不足。恐懼輒遺者。歸脾湯或五君子煎主之。有因下元虛冷。睡中自遺者。螵蛸丸主之。有因心腎不交。遺失不知者。寇氏桑螵蛸散主之。有因產後脬損。小便不禁者。補脬飲加參朮主之。有因妊婦脬熱。溺出不知者。加味逍遙散主之。有因腎氣虛弱。溺後餘瀝者。茯菟丸加覆盆子益智仁主之。有因肝腎濕熱。溺濇莖痛者。龍膽瀉肝湯主之。有因脬氣不足。溺頻晝甚者。縮泉丸主之。夜間溺多者。八味丸加五味主之。有因腸不固。滴瀝不禁者。固脬湯主之。（按與固脬丸不同）凡此種種。不勝枚擧。全在醫者臨牀鑒別。按症施藥。方克奏效。若症不探其源。藥不分其類。以一定之成法。治變化之疾病。宜乎其投之而不效也。（完）

□改良煎劑之討論（八）

（楊贊民）

第七節　改良煎劑之方法

余所欲最先解決者。即求所以解決中藥製治之方法。蓋中藥製治之法。如得解決。則可利用機器。以變化原料。而令病家獲無窮之利。我國藥品雖多。然綜其類而歸納之。可以概用下四種製法包括。

（一）膏　（二）精　（三）末　（四）露

余所論太簡單矣。閱者必惶惑莫所適從。以爲此區區四種製治之法。果能盡我國藥品之功用耶。我國藥品。果能與四種製法相合。而不失其本來性質耶。是皆閱者所諄諄必問者也。謹再絜其綱領而申之曰凡藥品氣味俱厚者宜於膏。概製膏可也。氣味俱薄者。宜於精。概提精可也。氣味平者。宜隨其使。諸香諸石。多宜於末。諸涼諸淡。多宜於露。我國藥物雖多。終可以此四者整御之矣。

四者之中。其爲湯藥必不能缺者。厥惟膏精末。若露者。以其辛薄涼淡。病家用以代茶。其益最著。故就可提精之藥。取出幾味。鈞以爲露。（凡鈞露者。皆可提精。不過爲病家徹底便利計。特加一種手續耳。）然不宜入於湯劑藥中。蓋露之味薄性輕。少用之。則無效。多用之。則並各種君臣佐使之藥。互相攙和。勢必盈盆溢碗。此灌水牛之藥也。病人耐之乎。

第八節　改良煎劑方法之準繩

諸藥製治之法。既得解決。後此手續，則當分類提煉矣。當其提煉爲膏精時。必謹記其原料之重量。提煉以後。再秤其輕重之數。視其折數若何。詳誌其上。如遇購藥者。可即就藥方中各藥分兩之多少。而据提煉之折數折與之。茲擧例數則如下。（末藥無折數）

人參二錢　熟地三錢　當歸三錢
白朮二錢　茯苓二錢　川芎錢半
白芍（酒炒）二錢　甘草一錢

右加姜三片棗二枚煎服